

Tabla de dosificación del acetaminofén y el ibuprofeno

Esta información no es específica para su hijo; solo le ofrece información general. Siga las instrucciones de su médico en lo que respecta a las dosis.

Acetaminofén (Tylenol® u otra marca)

Administrar cada 4 o 6 horas según sea necesario.

No administrar más de 5 dosis en un lapso de 24 horas.

Peso en libras (lb)	Acetaminofén líquido 160 mg*/5 ml <i>*Verifique la concentración</i>
5-6 lb	32 mg (1 mL)
6-7.5 lb	40 mg (1.25 mL)
7.5-9.5 lb	48 mg (1.5 mL)
9.5-12 lb	64 mg (2 mL)
12-14.5 lb	80 mg (2.5 mL)
14.5-19 lb	96 mg (3 mL)
19-23.5 lb	128 mg (4 mL)
23.5-28 lb	160 mg (5 mL)
28-35 lb	192 mg (6 mL)
35-45 lb	240 mg (7.5 mL)
45-60 lb	320 mg (10 mL)
60-70 lb	400 mg (12.5 mL)
70-100 lb	480 mg (15 mL)
Más de 100 lb	650 mg (20.3 mL)

Ibuprofeno (Advil®, Motrin® u otra marca)

Administrar cada 6 a 8 horas según sea necesario; se recomienda administrar con comida para disminuir el riesgo de malestar estomacal.

No administrar más de 4 dosis en un lapso de 24 horas.

NO administrar a niños menores de 6 meses a menos que se lo indique el médico.

Peso en libras (lb)	Ibuprofeno en suspensión 100 mg*/5 ml <i>*Verifique la concentración</i>
8-10 lb	30 mg (1.5 mL)
10-15 lb	40 mg (2 mL)
15-22 lb	60 mg (3 mL)
22-30 lb	100 mg (5 mL)
30-45 lb	125 mg (6.25 mL)
45-60 lb	200 mg (10 mL)
60-70 lb	250 mg (12.5 mL)
70-90 lb	300 mg (15 mL)
90-120 lb	400 mg (20 mL)
Más de 120 lb	600 mg (30 mL)