

## **Diazepam en gel para administración rectal en el hogar**

### **¿Cómo funciona este medicamento?**

El diazepam (también conocido como Valium®) es un medicamento de rescate que se utiliza para detener las convulsiones. Actúa calmando la hiperactividad presente de forma anormal en el cerebro y surte efecto, por lo general, en dos a diez minutos.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios?**

El diazepam normalmente causa somnolencia. También puede hacer que los niños se sientan confundidos, mareados, o que tengan dificultad momentánea en el habla. En contadas ocasiones, llega a provocar que la respiración de un niño sea superficial o lenta.

### **Siga las instrucciones de su médico para saber cuánto diazepam se tiene que administrar, cuándo tiene que administrarlo y si la dosis se puede repetir**

Este medicamento debe acompañar a su hijo dondequiera que vaya. Guarde todos los suministros (jeringa con el gel rectal y lubricante) juntos y en un sitio seguro de fácil acceso.

### **¿Cuándo debo llamar al médico?**

- Si su hijo tiene varias convulsiones y no vuelve a su estado normal.

### **¿Cuándo debo llamar al 911?**

- Si su hijo tiene dificultad para respirar o se pone de color morado.
- Si las convulsiones de su hijo se ven diferentes y más graves de lo normal.
- Si su hijo tiene síntomas de una reacción alérgica: sarpullido, urticaria o sibilancias.
- Si su hijo no le responde después de que se detenga la convulsión.
- Si le administra una segunda dosis de diazepam y las convulsiones no se detienen.
- Si el diazepam no detiene la convulsión en diez minutos o en el intervalo de tiempo que le indicó su médico.

Si su hijo deja de respirar, **empiece las respiraciones de rescate y llame al 911 para que venga una ambulancia. Si la actividad convulsiva no disminuye después del intervalo de tiempo recomendado, puede darle una segunda dosis de diazepam si así se lo recomendó el médico.**


### **¿Qué más debo saber?**

- Las heces de su hijo tendrán muy mal olor después de haber recibido el medicamento rectal.
- Sepa los nombres y las dosis de todos los medicamentos que su hijo toma. **Comparta esta información** con todas las personas que se ocupen de los cuidados de su hijo.
- Traiga el frasco con el medicamento cuando venga a las citas de la clínica o al departamento de emergencias.
- Cerciórese de tener suficiente medicamento a mano.
  - Mantenga un registro de cuántos rellenos le quedan cada vez que recoja el medicamento en la farmacia.
  - El farmacéutico necesitará dos o tres días para renovar la receta si se queda sin rellenos.
  - Compruebe las fechas de expiración cada mes. Asegúrese de que las nuevas jeringas se pueden utilizar durante al menos seis meses.
- Guarde todos los medicamentos en sus frascos originales y protéjalos de la luz del sol o el calor. No los guarde en sitios húmedos como el cuarto de baño. Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños y, si es posible, guárdelos bajo llave.
- Si viaja en avión, lleve el medicamento en su frasco original con la etiqueta de la receta adjunta, ya que el diazepam es una sustancia controlada.

**Si se administra demasiado diazepam, llame al Centro de Toxicología (Poison Control) al 1-800-222-1222.**

Llame a su clínica o farmacia si tiene alguna pregunta.


**Cómo administrar el diazepam en gel por vía rectal**




Prepare la jeringa de medicamento.



Coloque a su hijo en un lugar donde no pueda caerse y voltéelo de lado, mirando hacia usted. Descubra los glúteos y doble la pierna superior hacia delante para tener acceso al recto.



Quítele la tapa. Verifique que también salga la espiga (está adjunta bajo la tapa).



A) Separe los glúteos. B) Inserte suavemente la jeringa lubricada en el recto hasta llegar al borde de la jeringa.




Lubrique la punta de la aguja con el gel lubricante.



Cuenta hasta tres mientras aprieta suavemente el émbolo hasta que se detenga.



Cuenta hasta tres antes de sacar la jeringa.



Cuenta hasta tres mientras mantiene los glúteos juntos para evitar que se salga el medicamento.

### ¿Cómo desecho el medicamento?

Para desechar el medicamento que no ha utilizado, Children's recomienda que utilice un sistema para desactivar medicamentos. Este tipo de sistemas está disponible en la mayoría de las farmacias. Desechar los medicamentos de esta manera ayuda a proteger a las demás personas y preserva el medio ambiente.

Siga las instrucciones que aparecen en el sistema para desactivar y desechar el medicamento de la jeringa.

Para desechar el medicamento que queda en la jeringa:

1. Saque el émbolo de la jeringa.
2. Ponga la punta de la jeringa en la bolsa del sistema para desactivar medicamentos.
3. Introduzca el émbolo en la jeringa y apriete hasta que se detenga.

Una vez que el medicamento que le sobre esté desactivado y se haya desecho de él, tire la jeringa a la basura. No vuelva a utilizarla.

### ¿Tiene más preguntas?

Esta información no es específica para su hijo; solo le ofrece información general. Si tiene alguna pregunta, llame a la clínica.

