

Tabla de dosificación del acetaminofén y el ibuprofeno

Esta información no es específica para su hijo; solo le ofrece información general. Siga las instrucciones de su médico en lo que respecta a las dosis.

Acetaminofén (Tylenol® u otra marca)

Administrar cada 6 horas según sea necesario.

No administrar más de 4 dosis en un lapso de 24 horas.

Peso en libras (lb)	Acetaminofén líquido 160 mg*/5 ml <i>*Verifique la concentración</i>
5-6.5 lb	40 mg (1.25 ml)
6.5-8 lb	48 mg (1.5 ml)
8-10.5 lb	64 mg (2 ml)
10.5-13 lb	80 mg (2.5 ml)
13-16 lb	96 mg (3 ml)
16-20.5 lb	120 mg (3.75 ml)
20.5-26 lb	160 mg (5 ml)
26-32 lb	192 mg (6 ml)
32-41 lb	240 mg (7.5 ml)
41-53 lb	325 mg (10 ml)
53-65 lb	400 mg (12.5 ml)
65-90 lb	480 mg (15 ml)
Más de 90 lb	650 mg (20 ml)

Ibuprofeno (Advil®, Motrin® u otra marca)

Administrar cada 6 a 8 horas según sea necesario; siempre con comida.

No administrar más de 4 dosis en un lapso de 24 horas.

Peso en libras (lb)	Ibuprofeno en suspensión 100 mg*/5 ml <i>*Verifique la concentración</i>
8-14 lb	50 mg (2.5 ml)
14-20 lb	75 mg (3.75 ml)
20-25 lb	100 mg (5 ml)
25-30 lb	125 mg (6.25 ml)
30-38.5 lb	150 mg (7.5 ml)
38.5-50 lb	200 mg (10 ml)
50-60 lb	250 mg (12.5 ml)
60-72 lb	300 mg (15 ml)
72-82.5 lb	350 mg (17.5 ml)
82.5-94 lb	400 mg (20 ml)
94-105 lb	450 mg (22.5 ml)
105-115 lb	500 mg (25 ml)
115-126 lb	550 mg (27.5 ml)
Más de 126 lb	600 mg (30 ml)