

Tabla de dosificación del acetaminofén y el ibuprofeno

Acetaminofén (Tylenol® u otra marca)

Administrar cada 6 horas según sea necesario.

No administrar más de 4 dosis en un lapso de 24 horas.

Peso en libras (lbs.)	Acetaminofén líquido 160 mg/5 ml *Verifique la concentración
5-6.5 lbs.	40 mg (1.25 ml)
6.5-8 lbs.	48 mg (1.5 ml)
8-10.5 lbs.	64 mg (2 ml)
10.5-13 lbs.	80 mg (2.5 ml)
13-16 lbs.	96 mg (3 ml)
16-20.5 lbs.	120 mg (3.75 ml)
20.5-26 lbs.	160 mg (5 ml)
26-32 lbs.	192 mg (6 ml)
32-41 lbs.	240 mg (7.5 ml)
41-53 lbs.	325 mg (10 ml)
53-65 lbs.	400 mg (12.5 ml)
65-90 lbs.	480 mg (15 ml)
90 lbs. en adelante	650 mg (20 ml)

Ibuprofeno (Advil®, Motrin®, u otra marca)

Administrar cada 6 a 8 horas según sea necesario **con algún alimento.**

No administrar más de 4 dosis en un lapso de 24 horas.

Peso en libras (lbs.)	Ibuprofeno en suspensión 100 mg*/5 ml *Verifique la concentración
8-14 lbs.	50 mg (2.5 ml)
14-20 lbs.	75 mg (3.75 ml)
20-25 lbs.	100 mg (5 ml)
25-30 lbs.	125 mg (6.25 ml)
30-38.5 lbs.	150 mg (7.5 ml)
38.5-50 lbs.	200 mg (10 ml)
50-60 lbs.	250 mg (12.5 ml)
60-72 lbs.	300 mg (15 ml)
72-82.5 lbs.	350 mg (17.5 ml)
82.5-94 lbs.	400 mg (20 ml)
94-105 lbs.	450 mg (22.5 ml)
105-115 lbs.	500 mg (25 ml)
115-126 lbs.	550 mg (27.5 ml)
126 lbs. en adelante	600 mg (30 ml)

¿Tiene más preguntas?

Esta hoja no es específica para su hijo; sólo le ofrece información general. Si tiene alguna pregunta, llame a la clínica o a la farmacia.