









Medicamentos posoperatorios

Principios generales: Medicamentos para el dolor

- Agite todas las suspensiones.
- Mantenga los medicamentos a temperatura ambiente.
- Tomar más líquidos puede ayudar con el posible estreñimiento.
- El farmacéutico le puede dar más información acerca de los medicamentos

Medicamento	Uso	Efectos secundarios más comunes
Acetaminophen (Tylenol®)	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores leves o para la fiebre. • Agítelo bien y tómelo con comida. • Se puede tomar con ibuprofeno. 	 SE TOLERA BIEN
Ibuprofeno (Advil® or Motrin®)	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores leves o para la fiebre. • Revise con cuidado la concentración. • Tómelo CON comida para proteger el estómago. • Agítelo bien; se puede tomar con Tylenol®. 	 NÁUSEAS
Tramadol	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores leves o moderados. • Tómelo con comida. • NO contiene Tylenol®. • Se puede tomar con ibuprofeno, Tylenol® o con los dos. 	  NÁUSEAS ESTREÑIMIENTO
Oxycodone	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores fuertes. • Tómelo con comida. • NO contiene Tylenol®. 	   SUEÑO NÁUSEAS ESTREÑIMIENTO
Gotas para los oídos o los ojos	<ul style="list-style-type: none"> • Normalmente es un antibiótico combinado con un corticosteroide que se usa para el tratamiento o la prevención de infecciones y la inflamación. • Lea la hoja con información para el paciente o pregunte a la enfermera o al farmacéutico cuál es la mejor manera de utilizarlo. 	 SE TOLERA BIEN

Horas programadas (p.ej., 8 a.m.)	Medicamentos que hay que administrar y cantidad (p.ej., medicamento A, cantidad)	Fecha						

Exoneración de responsabilidad: Este documento de referencia está diseñado para su uso general con la mayoría de los pacientes y no puede sustituir el juicio general médico. Es posible que se necesite asistencia para que el documento se pueda adaptar a las necesidades específicas de cada paciente. Rev 8/2018.