













Medicamentos posoperatorios

Principios generales: Medicamentos para el dolor

- Agite todas las suspensiones
- Evite tomar las combinaciones de Tylenol® por duplicado
- Mantenga los medicamentos a temperatura ambiente
- Tomar más líquidos puede ayudar con el posible estreñimiento
- El farmacéutico le puede dar más información acerca de los medicamentos

Medicamento	Uso	Efectos secundarios más comunes
Acetaminophen (Tylenol®)	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores leves (1-3 en una escala de 10) o para la fiebre. • Agítelo bien y tómelos con comida. • Se puede tomar con ibuprofen. 	 SE TOLERA BIEN
Ibuprofen (Advil® o Motrin®)	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores leves (1-3 en una escala de 10) o para la fiebre. • Revise con cuidado la concentración. • Tómelos CON comida para proteger el estómago. • Agítelo bien; se puede tomar con Tylenol®. 	 NÁUSEAS
Tramadol	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores leves o moderados (3-5 en una escala de 10). • Tómelos con comida. • NO contiene Tylenol®. • Se puede tomar con ibuprofen, Tylenol® o con los dos. 	  NÁUSEAS ESTREÑIMIENTO
Lortab®, Vicodin® (hydrocodone + acetaminophen)	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores moderados (4-7 en una escala de 10). • Tómelos con comida. • Contiene Tylenol®. 	   SUEÑO NÁUSEAS ESTREÑIMIENTO
Oxycodone	<ul style="list-style-type: none"> • Se usa para dolores fuertes (7-10 en una escala de 10). • Tómelos con comida. • NO contiene Tylenol®. 	   SUEÑO NÁUSEAS ESTREÑIMIENTO
Bacitracin	<ul style="list-style-type: none"> • Antibiótico tópico que se usa para el tratamiento o la prevención de infecciones. • Lea la hoja con información para el paciente o pregunte a la enfermera o al farmacéutico cuál es la mejor manera de utilizarlo. 	 SE TOLERA BIEN
Gotas para los oídos o los ojos	<ul style="list-style-type: none"> • Es normalmente un antibiótico combinado con un corticosteroide que se usa para el tratamiento o la prevención de infecciones y la inflamación. • Lea la hoja con información para el paciente o pregunte a la enfermera o al farmacéutico cuál es la mejor manera de utilizarlo. 	 SE TOLERA BIEN

Horas programadas (p.ej., 8 a.m.)	Medicamentos que hay que administrar y cantidad (p.ej., medicamento A, cantidad)	Fecha						