

## La leche materna fortificada con la fórmula NeoSure Advance® (Spanish)

### ¿Por qué es necesario fortificar la leche materna?

Algunos bebés prematuros necesitan calorías y nutrientes adicionales, en menos volumen de fórmula, que les ayuden a aumentar de peso y estatura con mayor rapidez una vez que se les da de alta. Por ello, se puede agregar a la leche materna, leche maternizada (fórmula) en polvo NeoSure Advance.

### ¿Cómo se fortifica la leche materna?

1. Lávese las manos con agua y jabón. Antes de abrir la lata de fórmula, lave la tapa para evitar que entren gérmenes. Tanto los utensilios para medir como los recipientes que utilice, deberán estar limpios.
2. Caliente la leche materna hasta que esté a temperatura ambiente (o un poco más caliente), pues la fórmula en polvo tiende a formar grumos cuando se mezcla con leche materna fría.
3. Consulte la tabla de proporciones que aparece en la página 3. Vierta la cantidad de leche materna que desea en una taza transparente para medir líquidos: póngala sobre una superficie plana y verifique la medida colocándola a la altura de los ojos.
4. Para medir la fórmula use sólo la cuchara de medir que viene en la lata del producto, o una cuchara de medir estándar. Las medidas deben ser al ras.
5. Añada la fórmula en polvo a la leche materna, y mezcle o agite bien hasta que no queden grumos.

## Breast milk: Fortified (using NeoSure Advance® formula) (English)

### Why do I need to fortify my breast milk?

Some premature babies need more calories and nutrients in less volume to help them “catch up” in weight and length after they go home. NeoSure Advance formula powder can be added to your breast milk to increase the amount of calories and nutrients your baby receives.

### How do I fortify the breast milk?

1. Wash your hands with soap and water. Wash the top of the formula can before opening to prevent germs from getting into the baby’s feeding. Use clean measuring utensils and containers.
2. Breast milk mixes best when it is warmed to room temperature or above. The powder tends to clump if the breast milk is cold.
3. Check the recipe chart on page 3. Using a clear liquid measuring cup, measure the desired amount of breast milk. Set the measuring cup on a flat surface, and check the level of the liquid at eye level.
4. Use standard measuring spoons or the scoop provided in the can to measure the formula powder. Use level, not heaping, measures.
5. Add the powder to the breast milk. Mix well until the lumps are gone.

## ¿Cuánto tiempo se puede guardar la leche materna fortificada?

Guarde la leche fortificada en el refrigerador en un envase con tapa. Después de 24 horas deseche la que no haya usado.

Un mes después de abrir la lata, deseche la fórmula en polvo que haya sobrado.

## Cómo prepararse para alimentar al bebé

1. Agite suavemente la leche materna fortificada.
2. Caliéntela de una de las siguientes formas:
  - Haga correr agua caliente del grifo sobre el biberón.
  - Ponga el biberón en un recipiente con agua caliente.

**No utilice** hornos de microondas ya que no calientan uniformemente, de modo que parte de la leche queda más caliente y podría quemarle la boca al bebé.

3. Vuelva a agitar el biberón después de calentarlo. Antes de dárselo al bebé, verifique **siempre** que la leche no esté demasiado caliente.
4. Una vez que el bebé haya comido, deseche la leche que quede en el biberón.

## Instrucciones especiales *(Special instructions)*

El médico le ha recetado la fórmula NeoSure Advance para fortificar la leche materna, de modo que el bebé ingiera *(Your doctor has ordered breast milk fortified with NeoSure Advance formula to make)* \_\_\_\_\_ calorías por onza *(calories per ounce)*.

Actualmente el bebé está tomando aproximadamente *(At this time your baby takes about)* \_\_\_\_\_ onzas por biberón y *(ounces per feeding and)* \_\_\_\_\_ onzas al día *(ounces per day)*.

A medida que el bebé crezca, será necesario aumentar estas cantidades. Consulte al médico antes de cambiar el plan de alimentación del bebé.

## How long can I keep the fortified breast milk?

Store fortified breast milk in a covered container in the refrigerator. Throw away any unused fortified breast milk after 24 hours.

Throw away any unused formula powder one month after opening the can.

## Preparing to feed your baby

1. Gently shake the fortified breast milk.
2. Warm it in one of these ways:
  - Run warm tap water over the bottle.
  - Set the bottle in a pan of warm water.

**Do not** use a microwave because it heats unevenly, causing “hot spots” that could burn the baby’s mouth.

3. After warming, gently shake the bottle again. **Always** test the temperature of the breast milk before feeding.
4. Throw away any fortified breast milk left in the baby’s bottle after a feeding.

The amounts will need to be increased as your baby grows. Check with the doctor before changing your baby’s feeding plan.

## Tabla de proporciones de leche materna y fórmula NeoSure Advance®

(Breast milk + NeoSure Advance recipe chart)

Calorías por onza (Calories per ounce)	Leche materna	Breast milk	Fórmula en polvo (medida al ras, sin compactar)	Formula powder (unpacked, level)
<input type="checkbox"/> 22	6 onzas (¾ taza)	6 ounces (¾ cup)	1¼ cucharadita	1¼ teaspoons
	8 onzas (1 taza)	8 ounces (1 cup)	1½ cucharadita	1½ teaspoons
	12 onzas (1½ taza)	12 ounces (1½ cups)	2½ cucharaditas	2½ teaspoons
	16 onzas (2 tazas)	16 ounces (2 cups)	1 cucharada	1 tablespoon
	24 onzas (3 tazas)	24 ounces (3 cups)	1 medida*	1 scoop*
<input type="checkbox"/> 24	6 onzas (¾ tazas)	6 ounces (¾ cup)	2½ cucharaditas	2½ teaspoons
	8 onzas (1 taza)	8 ounces (1 cup)	1 cucharada	1 tablespoon
	16 onzas (2 tazas)	16 ounces (2 cups)	2 cucharadas	2 tablespoons
	20 onzas (2½ tazas)	20 ounces (2½ cups)	2 medidas*	2 scoops*
	24 onzas (3 tazas)	24 ounces (3 cups)	3 cucharadas	3 tablespoons
<input type="checkbox"/> 26	5 onzas	5 ounces	1 cucharada	1 tablespoon
	10 onzas (1¼ taza)	10 ounces (1¼ cup)	2 cucharadas	2 tablespoons
	14 onzas (1¾ taza)	14 ounces (1¾ cups)	2 medidas*	2 scoops*
	21 onzas	21 ounces	3 medidas*	3 scoops*
<input type="checkbox"/> 27	6 onzas (¾ taza)	6 ounces (¾ cup)	1 medida*	1 scoop*
	9 onzas	9 ounces	2 cucharadas	2 tablespoons
	12 onzas (1½ taza)	12 ounces (1½ cups)	2 medidas*	2 scoops*
	24 onzas (3 tazas)	24 ounces (3 cups)	4 medidas*	4 scoops*
<input type="checkbox"/> ____				

\*Use la cuchara de medir que viene con la fórmula en polvo. (\*Use the scoop provided with the formula.)

### ¿Tiene más preguntas?

Si tiene alguna pregunta, llame en horas de oficina al Servicio de Nutrición del hospital que le corresponda.

### Questions?

If you have any questions, please call Nutrition Services at your hospital during daytime hours.

Children's - Minneapolis: (612) 813-6865 o (612) 813-6960

Children's - St. Paul: (651) 220-6216

Children's Hospitals and Clinics of Minnesota  
Patient/Family Education  
2525 Chicago Avenue South  
Minneapolis, MN 55404  
6/07 ©Copyright, translated 8/07